



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

29 НОЯ 2024

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Стоп-зуд® суспензия

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,  
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-1.19-4418№ПВР-3-1.8/02093

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: Стоп-зуд® суспензия (Stop – itch suspension);  
международные непатентованные наименования действующих веществ:  
метионин, никотинамид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, триамцинолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Стоп-зуд® суспензия в 1 мл содержит в качестве действующих веществ:  
метионин – 20 мг, никотинамид (витамин РР) – 10 мг, рибофлавин  
(витамин В<sub>2</sub>) – 4 мг, пиридоксина гидрохлорид (витамин В<sub>6</sub>) – 2 мг,  
триамцинолон – 1 мг, а также вспомогательные вещества: глицерин,  
полисорбат 80, аспасвит Ц 200, янтарная кислота, ксантановая камедь,  
Na-карбоксиметилцеллюлоза, натрия бензоат, калия сорбат, вода очищенная.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию  
оранжево-желтого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее после  
взбалтывания.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения  
в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после вскрытия  
флакона – 14 суток.

Запрещается применение Стоп-зуд® суспензии по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 10 и 15 мл во флаконы  
полимерные, укупоренные крышками навинчиваемыми полимерными  
с контролем первого вскрытия. Каждый флакон оклеивают этикетками  
самоклеящимися. Флаконы по 10 и 15 мл упаковывают поштучно в пачки из  
картона. Каждую потребительскую упаковку препарата снабжают шприцем-  
дозатором и комплектуют инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном  
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при  
температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Стоп-зуд® суспензию следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии  
с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензия относится к группе: глюкокортикостероиды в комбинации.

10. Входящий в состав препарата триамцинолон является синтетическим глюкокортикоидом, обладает выраженным противовоспалительным и десенсибилизирующим действием. Механизм его действия заключается в блокировании высвобождения эозинофилами медиаторов воспаления, в том числе простагландинов, которые потенцируют воспалительный процесс; стимуляции биосинтеза липокортинов, обладающих противоотечной активностью; уменьшении количества тучных клеток, вырабатывающих гиалуроновую кислоту; снижении проницаемости капилляров.

Витамины группы В (В<sub>3</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>2</sub>) и метионин улучшают обмен веществ, ускоряют регенерацию тканей, способствуют восстановлению функционального состояния кожного покрова.

Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензия по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензию назначают собакам и кошкам для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи (атопический дерматит, экзема, диффузный нейродермит, расчесы, алопеции, реакции на укусы насекомых).

12. Противопоказанием к применению Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензии является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), период вакцинации, вирусные заболевания и диабет.

13. При работе с препаратом Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензия следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензией. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использовать пустую тару из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не рекомендуется применять препарат самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также щенкам и котят до 8-недельного возраста.

15. Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензию применяют животным перорально в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно с помощью шприца-дозатора 1 раз в сутки в следующих суточных дозах:

Таблица 1

Вид животного	Масса животного, кг	Суточная доза Стоп-зуд <sup>®</sup> суспензии, мл/животное
Собаки	до 10	0,5
	10 – 20	1,0
	20 – 30	1,5

	30 – 40	2,0
	более 40	2,0
Кошки	1 – 3	0,25
	3 и более	0,5

Первые 4 суток препарат применяют в терапевтической дозе, последующие 8 суток применяют половину суточной терапевтической дозы. Курс лечения может быть продлен по усмотрению лечащего ветеринарного врача.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности возможно угнетение, слюнотечение, полиурия, полидипсия, расстройства желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применение препарата прекращают и при необходимости назначают симптоматические средства.

17. При передозировке у животного возможно угнетение и рвота.

18. Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензию не рекомендуется применять одновременно с другими лекарственными препаратами, содержащими кортикостероидные гормоны.

19. При первом применении препарата в редких случаях у животного наблюдается быстро проходящая гиперсаливация.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Стоп-зуд<sup>®</sup> суспензия не предназначена для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Апиценна», 143985,  
Московская область, г. Балашиха,  
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Апиценна», 143985,  
Московская область, г. Балашиха,  
Полтевское шоссе, владение 4.  
+ 7 (495) 580-77-13,  
[www.apicenna.ru](http://www.apicenna.ru), [info@apicenna.ru](mailto:info@apicenna.ru).

Генеральный директор  
ООО «АПИ-САН»



А.А.Смирнов