

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ
02.05.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Капель ушных БАРС[®] при отодектозе собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329,
г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли ушные БАРС[®] (Guttae auriculares BARS[®]).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: диазинон, преднизолон.

2. Лекарственная форма: капли ушные.

Капли ушные БАРС[®] в 1 мл в качестве действующих веществ содержат диазинон – 0,5 мг и преднизолон – 0,3 мг, а в качестве вспомогательных веществ глицерин и спирт изопропиловый.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Капли ушные БАРС[®] расфасованными: по 5 и 10 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками; по 15, 20 и 30 мл - в полимерные флаконы-капельницы, закупоренные полимерными крышками; по 5 мл - в полимерные пипетки-капельницы разового применения. Стеклянные флаконы и полимерные флаконы-капельницы помещают индивидуально, а пипетки-капельницы – по 4 штуки, в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Капли ушные БАРС® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли ушные БАРС® относятся к комбинированным лекарственным препаратам с акарицидным и противовоспалительным действием.

10. Диазинон, входящий в состав лекарственного препарата, является фосфорорганическим соединением кишечного действия, обладает выраженной акарицидной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития клещей, паразитирующих на собаках и кошках, в том числе возбудителя отодектоза собак и кошек - *Otodectes cynotis*.

Преднизолон - синтетический глюкокортикостероид, обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием, стабилизирует проницаемость клеточных мембран, препятствует выработке медиаторов воспаления, оказывает противозудное и противоотечное действие.

Капли ушные БАРС® по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического и местнораздражающего действия; при попадании в глаза вызывают раздражение.

III. Порядок применения

11 Капли ушные БАРС® назначают собакам и кошкам для лечения отодектоза (ушной чесотки).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применение препарата животным при прободении барабанной перепонки.

13. Перед обработкой ушные раковины и слуховой проход очищают от струпьев и загрязнений тампоном, смоченным лекарственным препаратом, затем закапывают пипеткой в каждое ухо по 3-5 капель препарата (кошкам и мелким собакам – 3, средним собакам – 4 и крупным собакам – 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода, ушную раковину складывают вдоль и слегка массируют ее основание.

Обработку проводят двукратно с 5-7-дневным интервалом до клинического выздоровления животного, которое подтверждают микроскопическими исследованиями соскобов. При необходимости курс лечения повторяют.

Капли ушные БАРС® обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного.

В случае если животное трясет головой после применения лекарственного препарата, для предотвращения его разбрызгивания, голову животного следует в течение нескольких минут фиксировать.

14. При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае проводят симптоматическую и десенсибилизирующую терапию.

15. Особностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Запрещается применять лекарственный препарат беременным самкам. Животным в период лактации препарат может назначаться по «жизненным» показаниям и применяться под контролем ветеринарного врача. Не следует применять лекарственный препарат щенкам и котят моложе 4-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности лечения. В случае пропуска очередной обработки, лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Капель ушных БАРС® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и проявлении аллергических реакций (кожный зуд, повышенная саливация, рвота) его использование прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Капли ушные БАРС® не следует применять одновременно с другими акарицидными препаратами для обработки животных. Сведения о его несовместимости с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

20. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом Капли ушные БАРС® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каплями ушными БАРС®. В случае появления

аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем или
держателем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Капель ушных Барс при отодектозе кошек и собак, утвержденную Россельхознадзором 30 декабря 2010 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-7.0-3713N/7BP-2-1.9/0011