

Артикул:

302005

Наименование:

Смесь Priolac® VOM (Приолак VOM) — специализированный продукт диетического лечебного питания для детей раннего возраста, сухая смесь для питания детей с рождения. Предназначена для питания детей с рождения, в том числе для устранения колик, запоров и срыгиваний.

Изготовитель:

Aizzwatria Rechenween Hector B.K. Адрес производства: Гектор 1, B448 СК, Ресервиес, Нидерланды /
Aizzwatria Rechenween Hector B.K. Production address: Hector 1, B448 СК, Reservcies, Netherlands

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ», УНП 193143448, Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319

Страна производства:

Нидерланды

Рекомендации по использованию:

Важно согласовывать применение смеси для питания детей раннего возраста с врачом-педиатром. Несоответствующее приготовление, хранение и использование смеси Priolac® VOM могут иметь неблагоприятные последствия для здоровья ребёнка. Необходимо сухими и чистыми держать все предметы, необходимые для приготовления смеси. Всегда следует пользоваться сухой и чистой мерной ложкой, находящейся внутри банки. Банку нужно плотно закрывать только оригинальной пластиковой крышкой. Инструкция по использованию: откройте крышку, снимите защитную фольгу. Используйте для приготовления смеси мерную ложку, снимая горку сухой смеси специальным уровнем внутри банки. Поместите ложку обратно в банку и закройте крышку. После вскрытия упаковки храните банку в сухом прохладном месте при температуре до 25 °С, но не в холодильнике. Содержимое открытой банки следует использовать в течение 4 недель после вскрытия. Тщательно вымойте руки перед приготовлением смеси. Тщательно вымойте бутылочку, соску и крышку, прокипятите посуду не менее 5–10 минут. Вскипятите свежую питьевую воду, охладите её примерно до 40–45 °С и налейте необходимое количество в стерилизованную бутылочку. Добавьте количество порошка, указанное в таблице дозировки, используя прилагаемую мерную ложку. Закройте и хорошо встряхните бутылочку до полного растворения порошка. Перед кормлением проверьте температуру смеси на внутренней стороне запястья. Используйте готовую смесь в течение 1 часа после приготовления. Не употребляйте оставшуюся после кормления смесь. Хранить следует в сухом месте при температуре от 5 °С до 25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей на банку.

Комплектация:

мерная ложка

Соответствие:

маркировка ЕАС