

Согласовано
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ

15.07.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Стоп-интим® капли

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-11.18-4263№ПВР-3-4.6/01691

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Стоп-интим® капли (Stop-intim drops);
международное непатентованное наименование: мегестрол.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Препарат Стоп-интим® капли в качестве действующего вещества содержит мегестрола ацетат – 20 мг/мл и вспомогательные вещества: полисорбат-80, поливинилпирролидон, Na-карбоксиметилцеллюлозу, глицерин и полиэтиленгликоль-400.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию белого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 2; 2,5 мл в полимерных флаконах-капельницах в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками-капельницами. Каждый флакон с препаратом помещают в пачку из картона в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Стоп-интим® капли следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Препарат Стоп-интим® капли относится к гормональным лекарственным средствам группы эстрогенов и гестагенов.

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена и обладает свойством ингибировать

секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом, при недостаточном количестве ЛГ, процесс овуляции становится невозможным.

При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 48 часов.

Стоп-интим® капли по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Стоп-интим® капли назначают самкам для задержки и прерывания течки; самцам – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Противопоказанием к применению препарата Стоп-интим® капли является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет. Не следует применять препарат неполовозрелым животным.

13. При работе с препаратом Стоп-интим® капли следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Стоп-интим® капли. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Не допускается применение Стоп-интим® капель самкам в период беременности и вскармливания потомства.

15. Стоп-интим® капли вводят перорально за 1 – 2 часа до кормления, капая с помощью капельницы на корень языка или на кусочек лакомства. Перед применением суспензию во флаконе следует тщательно взболтать в течение 1 – 2 минут.

Доза препарата зависит от пола, массы животного и цели его применения.

Кошкам применяют препарат Стоп-интим® капли:

– с целью задержки течки – в период между течками один раз в неделю в дозе 4 капли на животное. Курс применения препарата – не более 18 месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

– с целью прерывания течки – при появлении первых признаков течки (но не позднее чем через 3 дня от ее начала) 5 – 7 раз с интервалом 24 часа в дозе 9 капель на животное.

В течение года следует проводить не более двух курсов применения лекарственного препарата.

Котам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в следующих суточных дозах – по 8 капель на животное.

Первые 7 дней лекарственный препарат применяют в суточной дозе, последующие 14 дней по ½ от суточной дозы.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У некоторых животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочных желез. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-интим® капель с кортикостероидами. Информация об особенностях взаимодействия с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

19. При первом применении лекарственного препарата у животного могут наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска приема применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат Стоп-интим® капли не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Апиценна», Московская область,
г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Апиценна», Московская область,
г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

Генеральный директор ООО «АПИ-САН»



А. А. Смирнов