

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ

23.08.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2
для лечения и профилактики болезней различной этиологии, повышения общей
резистентности и продуктивности животных

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 (ASD-2F – Antiseptic-stimulator Dorogova fraction 2).

Группировочное наименование лекарственного препарата: антисептики-стимуляторы.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального и наружного применения.

АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 является продуктом сухой перегонки сырья животного происхождения и содержит – не менее 10% комплекса биологически активных веществ, в том числе низкомолекулярные органические соединения, включая низшие карбоновые кислоты, их амиды и аммонийные соли, холиновые эфиры карбоновых кислот, холин, первичные и вторичные амины, пептиды, соли аммония углекислого, аммония уксуснокислого и воду.

3. Лекарственный препарат представляет собой жидкость от темно-желтого до красновато-коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие осадка от серого до черного цвета не более 20 мг/мл.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 30 суток. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат по 10, 20, 50 и 100 мл в стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками; по 20 и 50 мл в стеклянных флаконах, укупоренных полимерными навинчиваемыми крышками с капельницей и контролем первого вскрытия; по 10, 20, 100 и 250 мл в полимерных флаконах, по 0,5 и 1 л в полимерных бутылках и по 3 и 5 л в полимерных канистрах с навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению упаковывают в картонную пачку. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению лекарственного препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 4°C до 35°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 - относится к препаратам, регулирующим метаболические процессы.

10. АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 обладает широким спектром биологической активности, стимулирует моторную деятельность желудочно-

кишечного тракта, секрецию пищеварительных желез, повышает активность пищеварительных ферментов, способствует улучшению процессов пищеварения и усвоения питательных веществ, повышает активность тканевых ферментов, включая транспортную Na^+ и K^+ -АТФазы, рибонуклеазу, щелочную фосфатазу, участвующих в активном транспорте ионов и питательных веществ через клеточные мембраны, в процессах фосфорилирования, а также синтеза белковых веществ. В результате этого улучшается трофика тканей, повышается уровень обменных процессов и факторов естественной резистентности организма.

При наружном применении лекарственный препарат оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, стимулирует активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализует трофику и ускоряет восстановление поврежденных тканей.

Лекарственный препарат по степени воздействия на организм при пероральном введении относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает гепатотоксического, эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится животными разных видов и возраста.

III. Порядок применения

11. АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 - лекарственный препарат, предназначенный для применения сельскохозяйственным животным, включая птиц, и собакам с лечебной и профилактической целью при болезнях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, поражениях кожных покровов, нарушениях обмена веществ различной этиологии, для стимуляции деятельности центральной и вегетативной нервной системы, повышения естественной резистентности у ослабленных и переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных, для стимуляции роста и развития молодняка поросят и цыплят, а также повышения яйценоскости кур.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 назначают животным перорально с питьевой водой перед кормлением в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Разовые дозы лекарственного препарата для перорального применения сельскохозяйственным животным и собакам

Виды животных, возраст	Объем, мл	
	АСД-2Ф	Вода (до)
Крупный рогатый скот: от 3 лет и старше от 1 года до 3 лет до 1 года	20-30	200-400
	10-15	100-400
	5-7	40-100
Овцы: от 1 года и старше от 6 месяцев до 1 года до 6 месяцев	2-5	40-100
	1-3	20-80
	0,5-2	10-40
Лошади: от 3 лет и старше от 1 года до 3 лет до 1 года	10-20	200-600
	10-15	200-400
	5	100
Свиньи: от 1 года и старше от 6 месяцев до 1 года 2-3 месяца	5-10	100-200
	2-5	40-100
	1-3	20-80
Собаки старше 6 месяцев	2	40

При диспепсии, гастроэнтероколитах, гастроэнтеритах, а также дистрофических состояниях, вызванных расстройствами пищеварения и нарушениями обмена веществ, лекарственный препарат назначают животным перорально один раз в сутки в течение 15 дней.

При тимпании крупного рогатого скота лекарственный препарат выпаивают из бутылки или вводят в рубец через желудочный зонд один-два раза в сутки в течение 3 дней.

Лошадям при метеоризме кишечника лекарственный препарат выпаивают или вводят через желудочный зонд однократно. При необходимости лечение повторяют.

В комплексной терапии катаральной пневмонии, диспепсии, гастроэнтероколитов, гастроэнтеритов поросятам применяют лекарственный препарат один раз в день до кормления.

Для стимуляции центральной и вегетативной нервной системы, повышения резистентности у переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных, ускорения процессов заживления кожных покровов при некробактериозе, экземах, дерматитах, трофических язвах лекарственный препарат применяют один раз в сутки в течение 21 дня.

В целях повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, увеличения привесов и снижения смертности АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 назначают поросятам индивидуально в смеси с комбикормом из расчета 0,1 мл препарата на 1 кг массы животного с 7-дневного до 2-месячного возраста; телятам - выпаивают с молоком или водой для поения из расчета 0,1 мл препарата на 1 кг массы животного через день в течение 1-2 месяцев.

Наружно, внутриматочно, интравагинально лекарственный препарат применяют в виде 2-20% растворов, приготовленных в асептических условиях с использованием стерильного физиологического раствора. При приготовлении лечебного раствора требуемой концентрации, исходный стерильный раствор лекарственного препарата принимают за 100%.

Инфицированные вялозаживающие раны промывают 15-20% раствором лекарственного препарата, после этого накладывают смоченную этим раствором повязку. Лечение проводят 1-2 раза в сутки в течение 4-5 дней до очищения раны от экссудата. При наличии свищей, вскрытых полостей абсцессов, флегмон в их полость вводят марлевый дренаж, смоченный раствором лекарственного препарата, и сверху, накладывают стерильную повязку. Дренаж меняют ежедневно до образования грануляционного вала.

При мытье лошадей при наличии абсцессов в подчелюстном пространстве и на других частях тела после предварительного туалета, полости абсцессов промывают 15-20% раствором лекарственного препарата или вводят в них пропитанные раствором тампоны, один раз в день в течение 7-9 дней до очищения раны от экссудата и появления грануляции.

Коровам при вагинитах и задержании последа (после его удаления) применяют 3-5% водный раствор лекарственного препарата, подогретый до 40°C, которым промывают влагалище один раз в сутки в течение 4-5 дней, с нормой расхода 1,5-2 л на каждую процедуру. Если шейка матки открыта, внутриматочно вводят 200-300 мл раствора и сразу же его удаляют, используя катетер с обратным током жидкости.

При острых и хронических эндометритах, миометрите и пиометрите, если шейка матки открыта, в полость матки вводят 200-300 мл 15% водного раствора АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2, подогретого до 40°C и сразу же его удаляют, используя катетер с обратным током жидкости. Обработку проводят один раз в сутки в течение 4-5 дней.

В комплексной терапии трихомонозов коровам вводят во влагалище 200-300 мл 20% водного раствора лекарственного препарата с помощью шприца Жанэ с резиновой трубкой и специального катетера, имеющего на конечной части большое количество отверстий. Обработки проводят один раз в сутки в течение 5-7 дней.

Быкам при острой форме трихомоноза препуциальный мешок промывают 0,5-1,0 л 2-3% водного раствора лекарственного препарата, который вводят с помощью катетера, соединенного резиновой трубкой с кружкой Эсмарха. После этого наружное отверстие

препуциального мешка зажимают рукой на 3-5 минут и проводят легкий массаж. Обработки проводят один раз в сутки в течение 5-7 дней.

В птицеводстве для профилактики респираторных и желудочно-кишечных болезней, повышения резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды и продуктивности лекарственный препарат применяют птице групповым способом с водой или аэрозольно, в дозах указанных в таблице 2.

Таблица 2

Разовые дозы лекарственного препарата для применения сельскохозяйственной птице

Показания к применению	Доза АСД-2Ф	Схема применения
Суточным цыплятам для повышения резистентности, развития и формирования иммунитета	35 мл на 100 л питьевой воды	7 дней подряд, затем 2 дня до и 2 дня после вакцинации
Цыплятам, индюшатам, утятам, гусятам для стимуляции роста, при аптериозе	5 мл 10% водного раствора на 1 м ³ птичника	Аэрозольно в 1-, 10-, 28- и 38- дневном возрасте; экспозиция - 15 мин
Для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта (включая токсикозы) и повышения резистентности	3 мл на 100 голов птиц (15 мл/100 л воды)	С водой для поения в течение 7 дней подряд
При респираторных болезнях, в т.ч. инфекционном ларинготрахеите, инфекционном бронхите кур, респираторном микоплазмозе и колисептицемии	молодняку птиц - 10 мл на 1000 голов (5 мл/100 л воды); взрослому поголовью- 30 мл на 1000 голов (15 мл/100 л воды)	С водой для поения в течение 5 дней подряд
Курам-несушкам для профилактики овариосальпингитов и повышения яйценоскости	35 мл на 100 л питьевой воды	С водой для поения в течение 5-7 дней подряд
Цыплятам для стимуляции роста и развития	0,1 мл на 1 кг массы птицы	С водой для поения через день в течение 1-2 месяцев

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Лекарственный препарат разрешен для применения самкам животных в период беременности и лактации, а также их потомству.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в дозировках по схеме, указанных в настоящей инструкции.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 не исключает использование других лекарственных препаратов специфической и симптоматической терапии.

20. Продукция животноводства и птицеводства полученная в период применения препарата используется в пищевых целях без ограничения.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2, утвержденную Россельхознадзором 22 марта 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-10.17-3834N/ТФР-3-1.1/00937